




















ヨード造影剤併用禁忌薬剤と併用注意薬剤について

2017/2改訂 新古賀病院

ヨード造影剤を使用する検査(造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等)を行う場合には、**ビグアナイド系糖尿病用剤・ループ利尿剤・マンニトール・NSAIDsの服用を確認してください。**
 服用している場合は、併用禁忌薬剤のビグアナイド系糖尿病用剤では、**造影剤使用前後2日間(当日含め計5日間)**、使用を一時的に中止する必要があります。
 併用注意薬剤のループ利尿剤・マンニトール・NSAIDsでは、**临床上可能なら造影剤使用前後1日間(当日含め計3日間)**、使用を一時的に中止する必要があります。

ヨード造影剤併用禁忌薬剤

ビグアナイド系糖尿病剤(国内) (ヨード造影剤との併用で**乳酸アシドーシス**を発現。)

| 一般名 | 商品名 | 外観 | 商品名 | 外観 |
|-----|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | メトグルコ錠250mg (当院採用) |  | メトグルコ錠500mg |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「三和」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「三和」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「トーフ」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「トーフ」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「日医工」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「日医工」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「ニプロ」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「ニプロ」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「ファイザー」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「ファイザー」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「DSEP」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「DSEP」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「JG」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「JG」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「TCK」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「TCK」 |  |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「TE」 |  | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「TE」 |  |
| | グリコラン錠250mg |  | ネルビス錠250mg |  |
| | メデット錠250mg |  | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「JG」 |  |

塩酸メトホルミン

裏面へ続く

ヨード造影剤併用禁忌薬剤と併用注意薬剤について

2017/2改訂 新古賀病院

ヨード造影剤を使用する検査(造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等)を行う場合には、**ビグアナイド系糖尿病用剤・ループ利尿剤・マンニトール・NSAIDsの服用を確認してください。**
 服用している場合は、併用禁忌薬剤のビグアナイド系糖尿病用剤では、**造影剤使用前後2日間(当日含め計5日間)**、使用を一時的に中止する必要があります。
 併用注意薬剤のループ利尿剤・マンニトール・NSAIDsでは、**临床上可能なら造影剤使用前後1日間(当日含め計3日間)**、使用を一時的に中止する必要があります。

ヨード造影剤併用禁忌薬剤

ビグアナイド系糖尿病剤(国内) (ヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを発現。)

| 一般名 | 商品名 | 外観 | 商品名 | 外観 |
|------------|--------------------------|---|-------------------------|---|
| 塩酸メトホルミン | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「トーフ」 |  | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「SN」 |  |
| 塩酸ブホルミン | ジベトス錠 50mg |  | ジベトンS腸溶錠 50mg |  |
| | | | | |
| 塩酸メトホルミン合剤 | メタクト配合錠LD |  | メタクト配合錠HD |  |
| | エクメット配合錠LD |  | エクメット配合錠HD |  |
| | イニシク配合錠 |  | | |

ヨード造影剤併用注意薬剤(患者の状態を判断して下さい)

| | |
|-----------------|--|
| ループ利尿剤(主な国内先発品) | ラシックス、オイテンシン、ルネトロン、アレリックス、ダイアート、ルプラック等 |
| NSAIDs(主な国内先発品) | ボルタレン、ロキソニン、ハイペン、ナイキサン、セレコックス、モービック、ポンタール、ソランタール、パファリン330mg等 |