

●ヨード造影剤併用禁忌薬剤、併用注意薬剤一覧

2019/2改訂 新古賀病院薬剤課

ヨード造影剤を使用する検査(造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等)を行う場合には、
ビグアナイド系糖尿病用剤・NSAIDsの服用を確認してください。

* 併用禁忌薬剤(ビグアナイド系糖尿病用剤)では、**造影剤使用前後2日間(当日含め計5日間)**
使用を一時的に中止する必要があります。

* 併用注意薬剤(NSAIDs)では、**臨床上可能なら造影剤使用前後1日間(当日含め計3日間)**
使用を一時的に中止する必要があります。

併用禁忌薬剤

ビグアナイド系糖尿病剤(国内) (ヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを発現。)

| 一般名 | 商品名 | 外観 | 商品名 | 外観 |
|--------------|------------------------------|----|------------------------------|----|
| 塩酸 メトホルミン | メトグルコ錠250mg (当院採用) | | メトグルコ錠500mg | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「三和」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「三和」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「トーフ」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「トーフ」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「日医工」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「日医工」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「ニプロ」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「ニプロ」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「ファイザー」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「ファイザー」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「DSEP」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「DSEP」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「JG」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「JG」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「TCK」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「TCK」 | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「TE」 | | メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「TE」 | |
| | グリコラン錠250mg | | | |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「トーフ」 | | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「SN」 | |

裏面へ続く

ヨード造影剤併用禁忌薬剤と併用注意薬剤について

2019/2改訂 新古賀病院


ヨード造影剤を使用する検査(造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等)を行う場合には、
 ビグアナイド系糖尿病用剤・NSAIDsの服用を確認してください。

* 併用禁忌薬剤(ビグアナイド系糖尿病用剤)では、**造影剤使用前後2日間(当日含め計5日間)**
 使用を一時的に中止する必要があります。

* 併用注意薬剤(NSAIDs)では、**臨床上可能なら造影剤使用前後1日間(当日含め計3日間)**
 使用を一時的に中止する必要があります。

併用禁忌薬剤

ビグアナイド系糖尿病剤(国内) (ヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを発現。)

| 一般名 | 商品名 | 外観 | 商品名 | 外観 |
|--------------------|------------|---|---------------|---|
| 塩酸 ブホルミン | ジベトス錠 50mg |  | ジベトンS腸溶錠 50mg |  |
| | | | | |
| 塩酸 メトホルミン 合剤 | メタクト配合錠LD |  | メタクト配合錠HD |  |
| | エクメット配合錠LD |  | エクメット配合錠HD |  |
| | イニシク配合錠 |  | | |
| | メトアナ配合錠LD |  | メトアナ配合錠HD |  |

併用注意薬剤(患者の状態でご判断して下さい)

| | |
|-----------------|--|
| NSAIDs(主な国内先発品) | ボルタレン、ロキソニン、ハイペン、ナイキサン、セレコックス、モービック、 ポンタール、ソランタール、パファリン330mg等 |
|-----------------|--|