

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『CAPOX療法』

カペシタビン(Capecitabin)【day 1~14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

**対象症例** 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

**1クール** 3週間

薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m <sup>2</sup>	↑		↑

【カペシタビン投与表】 1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400 mg	8錠
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	3,000 mg	10錠
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	3,600 mg	12錠
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200 mg	14錠

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『CDDP+CPT-11療法』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + イリノテカン(CPT-11)【day1, 15】

対象症例	PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない。 水様下痢がない。臨床上腸管狭窄がない。 24時間CCrが50ml/min以上。高度の黄疸がない。 a) 切除不能胃癌のSecond line b) 転移再発胃癌のSecond line c) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	↑				↑
イリノテカン(CPT-11)	70mg/m <sup>2</sup>	↑		↑		↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『CPT-11単独療法』

イリノテカン(CPT-11)【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	35~42日				
	薬剤	投与量	day1	day8	day15
	イリノテカン(CPT-11)	100mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『HER+CAPOX療法』

カペシタビン【day 1~14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

<b>対象症例</b>	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合			
<b>1クール</b>	3週間			
薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m <sup>2</sup>	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

<b>【カペシタビン投与表】</b>	1日2回朝・夕食後30分以内	
体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400 mg	8錠
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	3,000 mg	10錠
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	3,600 mg	12錠
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200 mg	14錠

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『HER+SOX療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

<b>対象症例</b>	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合												
<b>1クール</b>	3週間												
	薬剤	投与量	day1	day15	day22								
	TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与 7日間休薬										
	オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m <sup>2</sup>	↑		↑								
	トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑								
<p>【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">体表面積</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">1日投与量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.25m<sup>2</sup>未満</td> <td>80 mg</td> </tr> <tr> <td>1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満</td> <td>100 mg</td> </tr> <tr> <td>1.5m<sup>2</sup>以上</td> <td>120 mg</td> </tr> </tbody> </table>						体表面積	1日投与量	1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg	1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg	1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg
体表面積	1日投与量												
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg												
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg												
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg												

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『HER+SP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】 + トラスツズマブ(HER)【day 1】

**対象症例** HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌  
※カペシタピンが使用できない場合

**1クール** 21日

薬剤	投与量	day1	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
シスプラチン(CDDP)	60mg/m <sup>2</sup>	↑	↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑	↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『HER+XP療法』

カペシタビン(Capecitabine)【day 1~day 14】+ シスプラチン(CDDP)【day1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例

PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50ml/min以上  
 a) HER2陽性切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line  
 b) HER2陽性転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール

21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

【カペシタビン投与表】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200 mg	14 錠


# 消化器科【胃癌】『mFOLFOX6療法』

## オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 2週間

薬剤	投与量	day1
オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	↑
レボホリナート(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	↑
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	↑
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	↑



## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(3週毎投与法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1】

対象症例	胃癌		
1クール	21日		
薬剤	投与量	day1	day22
アブラキサン(nab-PTX)	260mg/m <sup>2</sup>	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(毎週投与方法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	28日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
アブラキサン(nab-PTX)	100mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑	

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『Paclitaxel (PTX) 療法』

#### パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない。 a) 切除不能胃癌のSecond line b) 転移再発胃癌のSecond line c) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例 d) 腹膜播種症例					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑		↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『Ramucirumab療法』

ラムシルマブ【day1】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line		
1クール	2週間		
薬剤	投与量	day1	day15
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『Ramucirumab+nab-paclitaxel併用療法』

ラムシルマブ【day1, 15】+アブラキサン (nab-PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line				
1クール	28日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day29
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑	↑
アブラキサン (nab-PTX)	100mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『Ramucirumab+Paclitaxel併用療法』

ラムシルマブ【day1, 15】+パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line						
1クール	28日						
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day29		
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑		↑	
パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑		↑	

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『S-1+CDDP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 21】 + シスプラチン(CDDP)【day 8】

**対象症例**

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50mL/min以上  
 a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line  
 b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line  
 c) 術前補助化学療法のFirst line

**1クール**

35日

薬剤	投与量	day1	day8	day22	day36
TS-1	体表面積に応じて投与	21日間連日経口投与		14日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	60mg/m <sup>2</sup>		↑		

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(術後補助療法)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

**対象症例** StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

**1クール** 21日/42日

### 【1コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬

### 【2～7コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m <sup>2</sup>	↑	

### 【8～11or12コース】 TS-1+DTX併用終了後、手術1年後まで

薬剤	投与量	day1	day29
TS-1	体表面積に応じて投与	28日間連日経口投与	14日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(切除不能胃癌)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m <sup>2</sup>	↑	

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

**対象症例** a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line  
b) StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

**1クール** 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		
ドセタキセル(DTX)	40mg/m <sup>2</sup>	↑	7日間休薬	↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

### 消化器科【胃癌】『S-1+DTX+CDDP療法』

TS-1(S-1)**【day 1～day 14】** + ドセタキセル(DTX)**【day 8】** + シスプラチン(CDDP)**【day 8】**

#### 対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。  
投与開始日より3ヶ月以上の生存が期待できる。  
a) 切除不能胃癌のFirst line  
ただし、grade3以上の好中球減少や食思不振、嘔気が出現する頻度が高く、十分に症例を検討し、informed consentを得ること。

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ドセタキセル(DTX)	60mg/m <sup>2</sup>		↑		
シスプラチン(CDDP)	60mg/m <sup>2</sup>		↑		

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『SOX療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100mg/m <sup>2</sup>	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【 レジメン 】

### 消化器科【 胃癌 】『 XP 療法 』

#### カペシタビン(Capecitabine)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50mL/min以上

a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line

b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール

21日

		day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	↑		↑

【 カペシタビン投与表 】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200 mg	14 錠

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ+CAPOX療法』

ニボルマブ(オプジーボ)【day 1】+カペシタピン(Capecitabin)【day 1~14】+オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日




【カペシタピン投与表】 1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2,400 mg	8錠
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	3,000 mg	10錠
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	3,600 mg	12錠
1.96m <sup>2</sup> 以上	4,200 mg	14錠

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ + mFOLFOX6 療法』

ニボルマブ(オプジーボ) + オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU



## 【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ+SOX療法』

ニボルマブ(オプジーボ)【day1】+TS-1(S-1)【day1~day14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day1】

**対象症例** HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

**1クール** 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
ニボルマブ	360mg	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	100mg/m <sup>2</sup>	↑		↑
S-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【レジメン】

消化器科【胃癌】

ニボルマブ【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発胃癌の3次治療以降

1サイクル 14日

薬剤	投与量	day1	day15
ニボルマブ	240mg	↑	↑