

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 CAPOX療法 』

カペシタビン(Capecitabin)【day 1～14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発の胃癌			
1クール	3週間			
薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	↑		↑
※100mg/m ² 推奨(胃癌学会より)				

【 カペシタビン投与表 】

1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 CDDP+CPT-11 療法 』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + イリノテカン(CPT-11)【day1, 15】

対象症例	PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。 水様下痢がない。臨床上腸管狭窄がない。 24時間CCrが50ml/min以上。高度の黄疸がない。 a) 切除不能胃癌のSecond line b) 転移再発胃癌のSecond line C) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	↑				↑
イリノテカン(CPT-11)	70mg/m ²	↑		↑		↑

【レジメン】

消化器科【胃癌】『CPT-11単独療法』

イリノテカン(CPT-11)【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	35～42日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	
イリノテカン(CPT-11)	100mg/m ²	↑	↑	↑	

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 HER+CAPOX療法 』

カペシタビン【day 1～14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合			
1クール	3週間			
薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ² ※100mg/m ² 推奨(胃癌学会より)	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

【 カペシタビン投与表 】		1日2回朝・夕食後30分以内	
体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)	
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠	
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠	
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠	
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠	

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 HER+SOX療法 』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合				
1クール	3週間				
薬剤	投与量	day1	day15	day22	
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬		
オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ² ※100mg/m ² 推奨(胃癌学会より)	↑		↑	
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑	

【 TS-1投与表(1日量) 】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

消化器科【胃癌】『HER+SP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】 + トラスツズマブ(HER)【day 1】

対象症例 HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌
※カペシタビンが使用できない場合

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²	↑	↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑	↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 HER+XP 療法 』

カペシタビン(Capecitabine)【day 1～day 14】+ シスプラチン(CDDP)【day1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50ml/min以上
a) HER2陽性切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
b) HER2陽性転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール

21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

【 カペシタビン投与表 】 1日2回 朝・夕食後


体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14 錠

消化器科【胃癌】『mFOLFOX6 療法』

オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 2週間



【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(3週毎投与法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1】

対象症例	胃癌			
1クール	21日			
薬剤	投与量	day1	day22	
アブラキサン(nab-PTX)	260mg/m ²	↑	↑	

【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(毎週投与法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	28日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
アブラキサン (nab-PTX)	100mg/m ²				

【レジメン】

消化器科【胃癌】『Paclitaxel (PTX) 療法』

パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。					
	a) 切除不能胃癌のSecond line					
	b) 転移再発胃癌のSecond line					
	c) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例					
	d) 腹膜播種症例					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	↑	↑	↑		↑

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 Ramucirumab療法 』

ラムシルマブ【day1】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line			
1クール	2週間			
薬剤	投与量	day1	day15	
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑	↑	

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 Ramucirumab＋nab-paclitaxel併用療法 』

ラムシルマブ【day1, 15】＋アブラキサン（nab-PTX）【day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line						
1クール	28日						
	薬剤	投与量	day1	day8	day15		day29
	ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑		↑
	アブラキサン（nab-PTX）	100mg/m ²	↑	↑	↑		↑

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 Ramucirumab+Paclitaxel併用療法 』

ラムシルマブ【day1, 15】+パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line						
1クール	28日						
薬剤	投与量	day1	day8	day15		day29	
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑		↑	
パクリタキセル(PTX)	80mg/m ²	↑	↑	↑		↑	

消化器科【胃癌】『S-1+CDDP 療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 21】 + シスプラチン(CDDP)【day 8】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが $\geq 50\text{mL}/\text{min}$ 以上

- a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
- b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line
- c) 術前補助化学療法のFirst line

1クール

35日

薬剤	投与量	day1	day8	day22	day36
TS-1	体表面積に応じて投与	21日間連日経口投与		14日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	$60\text{mg}/\text{m}^2$				

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m^2 未満	80 mg
1.25m^2 以上 1.5m^2 未満	100 mg
1.5m^2 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(術後補助療法)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

1クール 21日/42日

【1コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬

【2～7コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²		

【8～11or12コース】 TS-1+DTX併用終了後、手術1年後まで

薬剤	投与量	day1	day29
TS-1	体表面積に応じて投与	28日間連日経口投与	14日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(切除不能胃癌)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²	↑	

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
b) StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 S-1+DTX+CDDP 療法 』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + ドセタキセル(DTX)【day 8】 + シスプラチン(CDDP)【day 8】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。
投与開始日より3ヶ月以上の生存が期待できる。
a) 切除不能胃癌のFirst line
ただし、grade3以上の好中球減少や食思不振、嘔気が出現する頻度が高く、十分に症例を検討し、informed consentを得ること。

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²		↑		
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²		↑		

【 TS-1投与表(1日量) 】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『SOX療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ² ※100mg/m ² 推奨(胃癌学会より)	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

消化器科【胃癌】『XP療法』

カペシタビン(Capecitabine)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50mL/min以上
a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール

21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	↑		↑

【カペシタビン投与表】1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14 錠

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 ニボルマブ+CAPOX療法 』

ニボルマブ(オプジーボ)【day 1】+カペシタビン(Capecitabin)【day 1～14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
ニボルマブ	360mg	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	↑		↑

※100mg/m²推奨(胃癌学会より)

カペシタビン 体表面積に応じて投与 14日間連日経口投与 7日間休薬

【 カペシタビン投与表 】		
1日2回朝・夕食後30分以内		
体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠


【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 ニボルマブ +mFOLFOX6 療法』

ニボルマブ(オプジーボ) + オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(l-LV) + 5-FU

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 14日



【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ+SOX療法』

ニボルマブ(オプジーボ)【day1】+TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
ニボルマブ	360mg	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	↑		↑

※100mg/m²推奨(胃癌学会より)

S-1 体表面積に応じて投与 14日間連日経口投与 7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】

ニボルマブ【day1】

対象症例	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発胃癌の3次治療以降			
1サイクル	14日			
薬剤	投与量	day1	day15	
ニボルマブ	240mg			

【レジメン】
消化器科【胃癌】『エンハーツ療法』
エンハーツ(トラスツズマブ デルクステカン)【day 1】

対象症例	がん化学療法後に増悪したHER2陽性切除不能な進行・再発胃癌(三次治療)			
1クール	3週間			
	薬剤	投与量	day1	day22
	エンハーツ(トラスツズマブ デルクステカン)	6.4mg/kg	↑	↑


【レジメン】

消化器科【胃癌】『キイトルーダ+CAPOX療法』

キイトルーダ【day 1】+カペシタビン(Capecitabin)【day 1～14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌における1次治療

1クール 21日



カペシタビン 体表面積に応じて投与 14日間連日経口投与 7日間休薬

【カペシタビン投与表】 1日2回朝・夕食後30分以内		
体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠

【レジメン】

消化器科【胃癌】『キイトルーダ+SOX療法』

キイトルーダ【day1】+TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例

HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌における1次治療

1クール

21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
キイトルーダ	200mg	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	↑		↑

※100mg/m²推奨(胃癌学会より)

S-1

体表面積に応じて投与

14日間連日経口投与

7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg


【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 ゾルベツキシマブ+CAPOX療法 』

ゾルベツキシマブ(ビロイ)【day 1】+カペシタビン(Capecitabin)【day 1～14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌（HER2陰性の患者）

1クール 21日



※100mg/m²推奨(胃癌学会より)

体表面積に応じて投与 14日間連日経口投与 7日間休薬

【 カペシタビン投与表 】

1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠


【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 ゾルベツキシマブ +mFOLFOX6 療法』

ゾルベツキシマブ(ビロイ) + オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(l-LV) + 5-FU

対象症例 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陰性の患者）

1クール 14日



【レジメン】

消化器科【胃癌】『ゾルベツキシマブ+SOX療法』

ゾルベツキシマブ(ビロイ)【day1】+TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌（HER2陰性の患者）

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 以降600mg/m ²	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	↑		↑

※100mg/m²推奨(胃癌学会より)

S-1 体表面積に応じて投与 14日間連日経口投与 7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg